

DRIMAVIN®

BROMURO DE OTILONIO 40 mg
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS



INDUSTRIA ARGENTINA VENTA BAJO RECETA

Fórmula cualicuantitativa

DRIMAVIN®

Cada comprimido recubierto contiene:

Bromuro de Otilonio	40,0 mg
Croscarmelosa Sódica	10,0 mg
Celulosa Microcristalina PH 200	113,5 mg
Almidón de Maíz	5,0 mg
Estearato de magnesio	1,5 mg
Opadry White	5,0 mg

Acción terapéutica

Antiespasmódico.

Indicaciones

Este producto está indicado para estados espasmódicos del intestino en adultos y niños mayores de 12 años de edad, especialmente en el síndrome del colon irritable. No usar para el cólico infantil.

Características Farmacológicas

Acción farmacológica

El Bromuro de Otilonio es un compuesto de amonio cuaternario con propiedades relajantes del músculo liso.

El mecanismo de acción preciso por el cual este compuesto ejerce su acción farmacológica no está del todo aclarado, aunque datos experimentales han relacionado su efecto miorelajante con el bloqueo de los canales L de calcio del músculo liso intestinal. La droga puede interactuar también con receptores muscarínicos, pero diversos ensayos clínicos han mostrado que a las dosis empleadas, el Bromuro de Otilonio ejerce su acción espasmolítica sin producir efectos anticolinérgicos. Además se ha encontrado un efecto antagonista del receptor PAF y de receptores NK2, pero no se conoce si esto repercute de alguna forma en la actividad terapéutica.

Farmacocinética

Los compuestos del tipo amonio cuaternario, como el Bromuro de Otilonio, tienen una pobre biodisponibilidad oral (5%) y un bajo pasaje de la barrera hematoencefálica.

En estudios con voluntarios sanos a los que se les administro Bromuro de Otilonio marcado, los niveles plasmáticos fueron muy bajos y pudieron solo ser detectados en general durante las primeras 6 horas luego de la administración.

La excreción en orina fue muy baja: 0,71+ 0,12% en 96 horas.

Después de este tiempo no pudo detectarse droga marcada en orina. La radioactividad fue casi totalmente excretada en las heces 97.1 + 4.5% en 7 días. La mayoría de la radioactividad en las heces se asocio con Bromuro de Otilonio no modificado.

Posología y forma de administración

Un comprimido recubierto 2 a 3 veces al día.

Los comprimidos recubiertos deben tomarse aproximadamente 20 minutos antes de las comidas, con medio vaso de agua.

La duración máxima del tratamiento es de 4 semanas.

En caso de reaparición de la sintomatología dolorosa, el médico deberá evaluar la conveniencia de instaurar un nuevo tratamiento.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al principio activo o a los excipientes. No debe administrarse en la obstrucción intestinal.

Precauciones

Si bien el Bromuro de Otilonio no presenta habitualmente efectos adversos de tipo antimuscarinico a las dosis recomendadas, se aconseja precaución al administrarlo en pacientes ancianos, especialmente en hombres con hipertrofia prostática y en caso de glaucoma, especialmente de ángulo estrecho.

Advertencias

Embarazo y lactancia: No se aconseja su administración durante el embarazo.

Niños: El producto no será prescripto a niños, hasta tanto no se adquiera suficiente experiencia en el campo pediátrico.

Reacciones adversas

A la dosis recomendada, el Bromuro de Otilonio es generalmente bien tolerado eventualmente puede causar en las personas sensibles un ligero cansancio, náuseas o ardor de estómago.

En un ensayo con 16 voluntarios sanos, el Bromuro de Otilonio no ha mostrado actividad antimuscarinica sistémica hasta una dosis de 240 mg diarios (6 comprimidos recubiertos), pero podrían ocurrir efectos tales como sequedad de mucosas, retención urinaria, constipación, visión borrosa, etc., a dosis mayores a las mencionadas.

Sobredosificación

Si se ingiere una sobredosis y se producen signos clínicos de intoxicación, son válidas las normas usuales de terapia contra intoxicaciones. No se conoce un tratamiento específico. El paciente deberá ser tratado en forma sintomática y deberán instituirse medidas de soporte.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6646 / 4658-7777 / 0800-333-0160.
- Hospital Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Presentaciones

Envases conteniendo 20, 30, 40, 60, 500 y 1000 comprimidos recubiertos, siendo estas dos últimas para uso hospitalario exclusivo.

Conservación

Conservar en el envase original. A temperaturas inferiores a los 30°C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 56772

Elabora y Distribuye

ROSSMORE PHARMA S.A

Director Tecnico Farm. Axel Greco

Jose Cubas 3351 – CABA

Tel.: (011) 4574 4455 / 4477

Elaborado en Galicia 2651 – CABA



rossmore
www.rossmore.us